




## COVID-19 YATAN HASTA ALGORİTMASI AĞIR PNÖMONİ<sup>1</sup>



<sup>1</sup> T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi" rehberine göre yönetilmelidir.

<sup>2</sup> Hidroksiklorokin QT aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabilir. QT uzaması için risk faktörleri, ileri yaş (≥65 yaş), kalp hastalığı öyküsü, hipokalemi başta olmak üzere elektrolit dengesizliği, diüretik (furozemid, tiazid) kullanımı, böbrek ve karaciğer yetmezliği, QT aralığını uzatan başka ilaç kullanımı ve sepsis varlığıdır. Riski olan hastalarda ilaca başlamadan önce bazal EKG çekilerek düzeltilmiş QT (QTc) hesaplanmalıdır. Bazal QTc >500 msn ise hidroksiklorokin tedavisinden kaçınılmalıdır.

<sup>3</sup> Gebelerde, lohusa veya emziren annelerde kullanılmamalıdır.

<sup>4</sup> Oksijen ihtiyacı olanlarda 6mg/gün deksametazon (veya eşdeğeri glukokortikoidler örneğin 40 mg/gün prednisolon veya 32 mg/gün metilprednisolon) 10 gün kadar kullanılabilir.